

# Untersuchung RAC-kontrollierte Akupunktur/Ohrakupunktur Stufe 3

<u>Was</u>	<u>Auflagen</u>	<u>Wo</u>	<u>Womit</u>	<u>Therapie</u>
<b><u>Voruntersuch</u></b>				
:				
Oszillation	∅	Yintang Mgo	Ultra-/Lidocain/ Cherry Pl., (od Freq A) Zuordnung: Check-P → Suche mit Ampulle, (Freq A)	Erdung AP Störherd (Go) Evtl. AP MgO bds (Stahl)
Inversion	Freq 5 (+9V) ipsi-lateral re und li	Yintang → Suche re u/o li ohne Auflage	Ultra-/Lidocain/ Cherry Pl. (Freq A), Zuordnung: Ultra-/Lidocain/ Cherry Pl.(Freq A), besser: Bestimmung auf KS6, ob Histamin od. Endoxan → Suche damit	AP Störherd evtl. Ggl. stellatum
Händigkeit	Freq 3 dom, (4 n-d), u/o. 2 Stäbe: + 9V dom, -9V n-d	Yintang	Ultra-/Lidocain/ Cherry Plum (Freq A)	
Lateralitäts- instabilität	∅	LSP dom.	Ginseng od. Freq D	Kontrolle am Schluss, wenn noch aktiv→ AP
<b><u>Störherde</u></b>				
SHP (m)	Freq 1 u/o. +9V kontralateral	1: Histamin 2: Endoxan 3: Cytotec 4: Vit. C 5: Ginseng	SH-Ampulle (Freq A) (stumme Zahn-SF: Freq. 7!)	
KSP (t)	Freq 1 u/o. +9V ipsilateral	Ohr re od. li	SH-Ampulle (Freq A) (stumme Zahn-SF: Freq. 7!)	nur markieren, erst nach Symptompkt. stechen
<b><u>Symptomatik</u></b>				
TPP	Freq 1 u/o. +9V ipsilateral	Ohr re od. li	Freq E (+/- B-Det)	Symptompkte (Go od. Si) werden zuerst gestochen
MPP	Freq 1 u/o. +9V kontralateral	Ohr re od. li	Freq 2 (+/- B-Det)	Symptompkte (Go od. Si) werden zuerst gestochen
OFF	Freq 3 dom, Freq 4 n-d. u/o. 1-Stab: + 9V dom, - 9V n-d	Ohr re od. li	+/- B-Det Freq 3 dom, Freq 4 n-d., nur wenn peripher keine Freq aufgelegt	meist Vitamingabe
<b><u>Energetik</u></b>				
Kardinalpkte	∅ od. Freq 5	Ohr re und li	+ B-Det, Freq 5, nur wenn peripher keine Freq aufgelegt	Am Schluss, evtl. 1. KP zu Beginn stechen
Hauptenergie- Punkte	∅	Nullpkt. +LG4	+ B-Det	Am Schluss
Erbenergiepkt e	∅	Ni3, Ni7, Lu7	+ B-Det	Am Schluss
Regenerations- punkte	∅	MdR und MdQi	Freq B (+ B-Det)	Am Schluss
Zonendom. Pkte	∅	Ohr bds.	Freq A-G od. + B-Det	Am Schluss